

二甲双胍相关乳酸酸中毒
【注意事项】。
乳酸酸中毒，应立即停
性支持治疗，建议立即

乳酸酸中毒的报告，包
被并仅伴有非特异性症
酸窘迫、嗜睡，严重的
型心律失常。二甲双胍
血乳酸水平升高(> 5
尿或酮血症)、阴离子
症)、乳酸/丙酮酸比
常> 5 μg/mL。二甲双
从而增加血液中乳酸的
尤其是高风险的患者。
乳酸酸中毒，应立即开
时立即停止服用本品。
酸中毒的患者，推荐
，排除蓄积的二甲双胍
二甲双胍可以1.70
经过这样的治疗通常症

中毒症状的教育，如果
用本品并就医。
二甲双胍相关乳酸酸中
降低风险和进行管理：
相关的乳酸酸中毒病例
的病人中。因为二甲双
损伤增加了二甲双胍蓄
。临床建议基于患者的

小球滤过率(eGFR)。
m²的患者应禁止服用，
减量。
每年检测eGFR，可能有
年人)，应当更频繁的

可能会增加二甲双胍相
肾功能、导致明显血流
增加二甲双胍蓄积的药

双胍相关的乳酸酸中毒
老年患者更可能有肝、
密切评估肾功能。
双胍治疗的患者静脉注
能改变，发生乳酸酸中
/1.73m²之间的患者应在
停止服用本品，有肝损
的患者给予动脉灌注碘
结束48小时后重新评估
开始用药。
过程对食物和液体的限
血压和肾功能损伤的风

险。组织
发白
足肌
肌肌
酸中
情方
过量
作用
长期
肝功
相关
致血
室形
维生
在一
7%
B₁₂以
维生
素B
情方
素B
血液
指黄
查于
在透
素B
不足
这必
能会
低血
单到
但兰
其他
酒老
患老
更易
患老
对糖
单到
糖，
但兰
类终

【孕妇】
孕妇
对于
胚，
接近
哺乳
二年
推荐
【儿童】
儿童
暂不
【老年】

由于老年患者可能出现肾功能